



Beoordelingsrapport

PATIËNTGEGEVENS

Naam **M. V.**
Geslacht **Niet opgegeven**
Leeftijd **27 jaar**
Geboortedatum **—**

ONDERZOEKSGEGEVENS

Testdatum **20-06-2026**
Rapportdatum **23-06-2026**
Locatie **Eindhoven Centrum**
Laboratorium **Star-SHL**

ALGHELE BEOORDELING

Vijf infecties onderzocht. Geen enkele is aangetoond.

Chlamydia en gonorroe zijn bepaald met PCR, die het genetisch materiaal van de bacterie zelf aantoonst. Syfilis, hiv en hepatitis B zijn bepaald via bloedonderzoek. Alle vijf de uitslagen zijn beoordeeld door een BIG-geregistreerde arts.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Geen infecties aangetoond

GOED

Chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv en hepatitis B zijn alle niet aangetoond.

Let op de vensterperiode

INFORMATIEF

Een test kan een infectie pas aantonen nadat de vensterperiode is verstreken. Voor hiv is dat met deze vierde-generatietest doorgaans zes weken; voor syfilis eveneens ongeveer zes weken. Bij een risicocontact korter dan zes weken geleden is een herhaling na die periode zinvol.

Getest is niet hetzelfde als beschermd

INFORMATIEF

Deze uitslag beschrijft het moment van afname. Hij zegt niets over contacten daarna.

GEDETAILEERDE ANALYSE

SOA

NORMAAL

Chlamydia en gonorroe zijn onderzocht met PCR. Deze methode toont het DNA van de bacterie aan en is daarmee gevoeliger dan een kweek. De vensterperiode is kort: ongeveer twee weken na het risicocontact is de uitslag betrouwbaar.

Syfilis is onderzocht met een screeningstest op antistoffen. Antistoffen worden pas na enkele weken aantoonbaar; ongeveer zes weken na het contact is de uitslag betrouwbaar.

Hiv is onderzocht met een vierde-generatietest, die zowel antistoffen als het p24-antigeen aantoonst. Doordat het p24-antigeen eerder verschijnt dan antistoffen, is de vensterperiode korter dan bij oudere tests: doorgaans zes weken.

Hepatitis B is onderzocht met HBsAg, het oppervlakte-antigeen van het virus. Een niet-aangetoonde HBsAg sluit een actieve infectie uit, maar zegt niets over vaccinatiestatus of een doorgemaakte infectie.

AANBEVELINGEN

1

Herhaal bij een recent risicocontact

Was het risicocontact korter dan zes weken geleden, herhaal dan de hiv- en syfilisbepaling na die zes weken. Chlamydia en gonorroe zijn na ongeveer twee weken al betrouwbaar.

2

Wil je weten of je beschermd bent tegen hepatitis B

Daarvoor is anti-HBs nodig, een andere bepaling dan HBsAg. HBsAg beantwoordt de vraag "heb ik het nu"; anti-HBs beantwoordt de vraag "ben ik ertegen beschermd".

VERVOLGSTAPPEN

Bij deze uitslagen is geen behandeling en geen vervolgonderzoek nodig.

Neem contact op met je huisarts of een SOA-poli als je klachten krijgt, of als je twijfelt of het risicocontact binnen de vensterperiode viel. Dit rapport blijft alleen in je eigen account staan.

TESTRESULTATEN

Overzicht resultaten

5 resultaten onderzocht

Alle resultaten binnen referentiewaarden

Alle 5 onderzochte waarden vallen binnen de referentiewaarden.

Binnen referentie (5)

Chlamydia PCR Referentie: Negatief	Negatief	NORMAAL
Gonorroee PCR Referentie: Negatief	Negatief	NORMAAL
Syfilis Screening Referentie: Negatief	Negatief	NORMAAL
HIV I+II Referentie: Negatief	Negatief	NORMAAL
HBsAg Referentie: Negatief	Negatief	NORMAAL

**VOORBEELDRAPPORT — FICTIEVE WAARDEN VAN EEN NIET-BESTAANDE PERSOON. GEEN MEDISCH
ADVIES.**

DISCLAIMER

Dit rapport is opgesteld door een BIG-geregistreerde arts. Het vervangt geen persoonlijk medisch consult. Raadpleeg bij vragen altijd uw huisarts.

Gegenereerd op: 24-08-2026 00:52